



USO VETERINÁRIO



ALTEC PASTA PARA EQUINOS

IVERMECTINA 2%

Antiparasitário de amplo espectro para equinos.

VANTAGEM:

O produto não demonstrou efeitos adversos quando administrado em equinos jovens, garanhões em serviço e éguas prenhas.

ATENÇÃO: OBEDECER AOS SEGUINTE PERÍODOS DE CARÊNCIA:

EQUINOS: ABATE: DEVE-SE OBSERVAR UM INTERVALO MÍNIMO DE 21 DIAS DA ÚLTIMA APLICAÇÃO AO ABATE, QUANDO O ANIMAL SE DESTINA AO CONSUMO HUMANO.

A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO EM CONDIÇÕES DIFERENTES DAS INDICADAS NESTA BULA PODE CAUSAR A PRESENÇA DE RESÍDUOS ACIMA DOS LIMITES APROVADOS, TORNANDO O ALIMENTO DE ORIGEM ANIMAL IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO.

Venda sob prescrição e aplicação sob orientação do Médico Veterinário.

APRESENTAÇÕES:

Bisnaga com 6 g.

Validade do Produto: 3 (três) anos após a data de fabricação.

Licenciado no Ministério da Agricultura sob nº 5.958 em 12/05/1997.

Resp. Técnico: Oswaldo de Souza Garcia - CRMV-SP 01.225.

FÓRMULA (em 100 g de produto):

Ivermectina 2,00 g
Excipiente q.s.p. 100,00 g

INDICAÇÕES:

Para tratamento e controle dos seguintes parasitas: adultos e larvas de *Strongylus vulgaris*, *S. edentatus*, *S. equinus* e *Triodontophorus spp.*, *Trichostrongylus axei*, *Strongyloides westeri*, *Oxyuris equi*, *Parascaris equorum* e verme pulmonar *Dictyocaulus arnfi* Ildi.

Pequenos strongilídeos: adultos e larvas de *Cylicostephanus spp.*, *Gyaloccephalus spp.*, *Cyathostomum spp.*, *Cylicodontophorus spp.*, *Cylicocyclus spp.*, incluindo helmintos resistentes aos bezimidazóis.

Larvas de *Gasterophilus spp.*, larvas cutâneas de *Habronema spp.*, *Draschia spp.* e microfilárias e *Onchocerca spp.*

POSOLOGIA:

Altec Pasta para equinos deve ser administrado por via oral, com seringa dosadora específica, utilizando-se a dose de 200 µg / kg de peso corporal.

Girar o anel da seringa, fixando-o na graduação do êmbolo que coincida ou mais se aproxime do peso do equídeo a ser tratado. Introduzir a extremidade da seringa lateralmente na boca do animal, procurando atingir o espaço interdental e depositar o produto em cima da língua no fundo da cavidade bucal.

Recomenda-se que imediatamente após a aplicação, levante-se a cabeça do animal mantendo-a nesta posição por alguns segundos. Cuidar para que o animal não procure de alguma maneira se livrar do medicamento.

É conveniente que durante a aplicação o animal não tenha nada na boca que possa se misturar com o produto (ex.: feno, capim, farelo, etc.) porque neste caso a pasta poderia cair da boca juntamente com os restos de alimento. Uma seringa de 6 g é suficiente para tratar 600 kg de peso.

CUIDADOS:

. Conservar este produto em local seco e fresco, ao abrigo da luz solar. Não utilizar a embalagem vazia, descartar de forma segura evitando contaminar o meio ambiente.

. Conservar fora do alcance de crianças e de animais domésticos.

. Não fumar ou se alimentar durante a aplicação e lavar as mãos após manusear o produto.

. Alguns animais podem apresentar edema e prurido após o tratamento. Embora os sintomas desapareçam espontaneamente após alguns dias, recomenda-se tratamento sintomático.



Proprietário e Fabricante: Fabiani Saúde Animal Ltda.
R. Centro Africana, 219 - Sto. Amaro - São Paulo/SP
Cep: 04730-050 - C.N.P.J. 15.741.848/0001-49
Serviço de Atendimento ao Consumidor:
0800-7731900 - www.fabianisaudeanimal.com.br
sac@fabianisaudeanimal.com.br
Indústria Brasileira